


การเจือจางยาโคเมอร์เนติ (Comirnaty™) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข้มข้น
สำหรับกระจายตัวสำหรับฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฟาสีม่วง)




คว่ำซ้ำ ๆ 10 ครั้งอย่างเบามือ

- นำวัคซีนที่ละลายจากการแช่แข็งแล้วไปวางในอุณหภูมิห้อง และคว่ำขวดวัคซีนขึ้นลง ซ้ำ ๆ อย่างเบามือ 10 ครั้ง ก่อนที่จะเจือจาง ห้ามเขย่า
- ก่อนเจือจาง วัคซีนที่ละลายจากการแช่แข็งแล้วอาจมีอนุภาคสีขาวถึงสีออกเหลืองอ่อนได้



สารละลายโซเดียมคลอไรด์
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ชนิดฉีด
ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร

- จะต้องเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแช่แข็งแล้วในขวดเดิมด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร โดยใช้เข็มฉีดยาชนิด 21 gauge หรือเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกว่าและใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ



ตั้งก้านกระบอกฉีดยา
กลับขึ้นมากที่ 1.8 มิลลิลิตร
เพื่อดีอากาศออกจากขวด

- ปรับความดันในขวดวัคซีนให้สมดุลก่อนดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดวัคซีน โดยดูุดอากาศปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร เข้าไปในกระบอกฉีดยาเปล่า




คว่ำซ้ำ ๆ 10 ครั้งอย่างเบามือ

- คว่ำขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแล้วซ้ำ ๆ อย่างเบามือ 10 ครั้ง ห้ามเขย่า
- วัคซีนที่เจือจางแล้วควรเป็นวัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองอ่อน (off-white) ซึ่งไม่มีอนุภาคที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- ห้ามใช้วัคซีนที่เจือจางแล้วหากเห็นว่ามีอนุภาคหรือเปลี่ยนสี



แก้ไขวันที่และเวลาที่ถูกต้องและ
ใช้วัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงหลังเจือจาง

- ควรแก้ไขวันที่และเวลาที่ถูกต้องไว้บนขวดวัคซีนที่เจือจางแล้ว
- หลังจากเจือจาง ให้เก็บวัคซีนไว้ในอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและใช้วัคซีนภายใน 6 ชั่วโมง
- ห้ามแช่แข็งหรือเขย่าวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแล้ว หากนำไปแช่เย็น ควรทิ้งวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแล้วให้มีอุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้



ดูดวัคซีนที่เจือจางแล้ว
0.3 มิลลิลิตร

- หลังจากเจือจาง จะมีวัคซีนบรรจุในขวด 2.25 มิลลิลิตร ซึ่งจะสามารถดูดวัคซีนโดสละ 0.3 มิลลิลิตรจากขวดวัคซีนได้ 6 โดส
- ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ ทำความสะอาดจุกยางของขวดวัคซีนโดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดจุกยาง
- ขนาดวัคซีนสำหรับฉีดแต่ละโดสต้องมีปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร
- ห้ามนำวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

สำหรับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงสามารถหายได้เอง โดยควรเฝ้าระวังหลังจากฉีดไปแล้ว 30 นาทีแรก แต่ถ้ามีอาการแพ้รุนแรงมักจะเกิดอาการภายใน 15 นาที

อาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรง เช่น

- ปวด บวม แดง ร้อน คัน บริเวณที่ฉีด
- ไข้ต่ำ
- ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- อ่อนเพลีย

อาการข้างเคียงชนิดรุนแรง ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด หรือโทร 1669 เช่น

- ไข้สูง
- ใจสั่น
- หनावสั้น
- แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
- ปวดศีรษะรุนแรง
- หน้าเขียว ปากเขียว
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีจุดเลือดออกจำนวนมาก
- ผื่นขึ้นทั้งตัว ตุ่มน้ำพอง
- บวม เช่น หน้าบวม คอบวม บวมทั่วร่างกาย